

Marasmius oreades (Bolton) Fr.



Senderuela, seta de carrerilla
© Gabriel Moreno y Miguel Ángel Ribes

Marasmius collinus (Scop.) Singer



Falsa senderuela
© José Cuesta

Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.



Seta de cunetas
© Miguel Ángel Ribes

	Marasmius oreades	Marasmius collinus	Clitocybe rivulosa
Sombrero	Crema parduzco, convexo con mamelón central. Higrófono. Estriado en el margen	Crema parduzco, convexo con mamelón central. Higrófono. Estriado en el margen	Blanquecino, plano a deprimido en el centro. No estriado en el margen
Láminas	Espaciadas, sinuadas a libres	Espaciadas, sinuadas a libres	Apretadas, adnatas a ligeramente decurrentes
Pie	Macizo, duro y elástico. Se puede retorcer sin romper	No elástico, se rompe fácilmente a la torsión	Hueco en la madurez, blanco y no elástico
Olor	Almendras amargas	A ajo	Fúngico poco remarcable
Observaciones	<p><i>Marasmius oreades</i> se caracteriza bien por su sombrero mamelonado, higrófono y estriado en el margen en tiempo húmedo, láminas blanquecinas a crema rosadas, pie cilíndrico y elástico (se le puede dar 2-3 vueltas sobre su eje sin romperse). Se comercializa generalmente desecada para evitar las trazas de ácido cianhídrico que contiene en crudo. <i>Marasmius collinus</i> es una especie muy parecida que prácticamente sólo se diferencia por el pie no elástico, que se rompe fácilmente al retorcerlo. <i>Clitocybe rivulosa</i>, normalmente de color claro, puede presentar tonos beige similares a <i>Marasmius oreades</i>, pero tiene las láminas decurrentes, margen del sombrero no estriado y no tiene olor de almendras amargas.</p>		