

*Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm.



Seta de alpaca, seta de concha, seta de ostra  
© José Cuesta

*Pleurocybella porrigens* (Pers.) Singer



Espátula blanca  
© José Cuesta

*Pleurocybella porrigens* (Pers.) Singer



Espátula blanca  
© Miguel Ángel Ribes

	<i>Pleurotus ostreatus</i>	<i>Pleurocybella porrigens</i>
<b>Sombrero</b>	De color muy variable, de gris claro a gris oscuro con reflejos azulados a tonos pardos, desde muy claros a muy oscuros	De color blanco, a veces con algunos tonos crema claro
<b>Pie</b>	Excéntrico, casi nulo	Ausente
<b>Hábitat</b>	Casi exclusivamente descomponiendo tocones o troncos de diferentes especies de planifolios	En Europa crece únicamente en troncos en descomposición de diferentes especies de coníferas de montaña: píceas, abeto y pino. Especie rara
<b>Observaciones</b>	<i>Pleurotus ostreatus</i> presenta sombreros con tonalidades muy variables, pudiendo llegar a ser prácticamente blancos. <i>Pleurocybella porrigens</i> fue considerada una especie comestible hasta que en 2004 se describieron en Japón varios casos de intoxicación, de entre los cuales se produjeron al menos 19 fallecimientos como consecuencia de su ingestión. Las muertes se produjeron por encefalopatía aguda y en casi todos los casos de intoxicación estuvieron implicadas personas que padecían previamente insuficiencia renal.	