

**Rhizopogon luteolus** Fr. & Nordholm s.l. (= *Rhizopogon obtexus* (Speng.) R. Rauschert)



© J. Marcos Criadilla, nacida, dardillo, patata de tierra

**Choiromyces meandriformis** Vittad.



© Fdo. Rodríguez Trufa de los cerdos, trufa de los meandros

**Tuber aestivum** Vittad.



© Miguel Ángel Ribes Trufa de verano, trufa blanca

|                      | <i>Rhizopogon luteolus</i>   | <i>Choiromyces meandriformis</i>   | <i>Tuber aestivum</i>                 |
|----------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Superficie</b>    | Amarillenta a ocrácea, sin cambio de color al roce, cubierta en su totalidad por rizomorfos  | Ocre marrón rojizo. Sin rizomorfos | Negra a marrón oscuro. Sin rizomorfos |
| <b>Verrugas</b>      | No tiene   | No tiene                           | Muy prominentes                       |
| <b>Gleba</b>         | Blanca de joven, luego oliváceo a pardo oliváceo oscuro al madurar   | Marrón claro                       | Marrón                                |
| <b>Olor</b>          | Ligeramente afrutado o fúngico   | Complejo, fétido al madurar        | Agradable, a cereal tostado           |
| <b>Observaciones</b> | La comparativa entre <i>Rhizopogon luteolus</i> y <i>Tuber aestivum</i> (u otras trufas verdaderas), ambas comestibles comercializables, se hace obligatoria por la diferencia de calidad y de precio entre ambas, siendo muy superior en las trufas. La mayoría de lo que se recolecta en España como <i>R. luteolus</i> , en realidad se trata de <i>Rhizopogon verii</i> Pacioni. |                                    |                                       |