

Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.



Capuchina, seta de charol

© José Cuesta

Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél.



© Gabriel Moreno

Amanita phalloides (Fr.) Link



Cicuta verde, oronja verde o mortal

© Gabriel Moreno

	<i>Tricholoma portentosum</i>	<i>Tricholoma sejunctum</i>	<i>Amanita phalloides</i>
Sombrero	Negruczo grisáceo	Amarillento	Con tonalidades verdosas
Láminas	Sinuadas, blanquecinas con tonos amarillentos en la madurez	Sinuadas, blanquecinas, a veces con tonos amarillentos en la madurez	Libres, blancas
Anillo	Sin anillo	Sin anillo	Con anillo membranoso
Volva	Sin volva	Sin volva	Con volva membranosa
Observaciones	<i>Tricholoma portentosum</i> tiene el sombrero oscuro con fibrillas radiales violáceo negruzcas, láminas y pie blanquecinos o con tonos amarillentos ligeros, es frecuente en bosques de coníferas y muy buscada por ser un excelente comestible. Se mantiene con las primeras heladas. <i>Tricholoma sejunctum</i> se diferencia bien por sus coloraciones amarillentas. El sombrero con fibrillas oscuras de <i>T. portentosum</i> puede recordar a <i>Amanita phalloides</i> , pero el sombrero con tonos verdosos, las láminas siempre blancas, el anillo y la volva blanquecina la diferencian con claridad. De aquí la importancia de extraer las setas completas y no cortadas para ver bien la volva si la poseen.		