

***Cyclocybe aegerita* (V. Brig.) Vizzini (cultivado)** (≡ *Agrocybe aegerita* V. Brig.) (= *A. cylindracea* (DC.) Maire) (= *C. cylindracea* (DC.) Vizzini & Angelini)



Seta de chopo

© Miquel Bolea

***Cyclocybe aegerita* (V. Brig.) Vizzini (cultivado)** (≡ *Agrocybe aegerita* V. Brig.)



Seta de chopo

© Miquel Bolea

***Cyclocybe aegerita* (V. Brig.) Vizzini (silvestre)** (≡ *Agrocybe aegerita* V. Brig.)



Seta de chopo

© Javier Marcos

Observaciones

Conocida popularmente como de seta de chopo, fructifica de forma fasciculada sobre tocones o troncos de árboles vivos o muertos, tanto de chopo como de sauces, olmos, plátanos, acacias y otros. Se cultiva en Japón, China, Corea y Australia, en general a pequeña escala. En España su cultivo es prácticamente inexistente. Como sustrato utilizado para su cultivo se ha descrito la paja de trigo, cortezas molidas o serrín de álamo blanco (*Populus alba*). No hay diferencias notables entre la forma cultivada y la silvestre, aunque al ser muy fotosensible, la cantidad de luz recibida durante el crecimiento puede variar la coloración, desde casi blanco a marrón oscuro.



***Cyclocybe aegerita* (V. Brig.) Vizzini (cultivado)**



© Miquel Bolea