

***Amanita pantherina* (DC.) Krombh.**



© Luis Alberto Parra **Orojna pantera, falso galipierno**

***Amanita excelsa* (Fr.) Bertill.**



© Miguel Ángel Ribes

Orojna de pie grueso

***Amanita rubescens* Pers.**



Orojna vinosa, vinosa

© Luis Alberto Parra y José Gerardo López

	<i>Amanita pantherina</i>	<i>Amanita excelsa</i>	<i>Amanita rubescens</i>
Sombrero	Margen a menudo estriado	Margen a menudo no estriado	Margen a menudo no estriado
Pie	Blanco	Blanco o con escamas grisáceas	Blanco o con escamas rosadas
Anillo	Frecuentemente liso	Estriado	Estriado
Volva	Circuncisa y escalonada, blanca	Escamosa, muy reducida, blanquecina o grisácea	Escamosa, muy reducida, blanquecina o crema rojiza
Observaciones	<i>Amanita rubescens</i> enrojece lentamente en todas las partes del cuerpo fructífero, especialmente en zonas parasitadas por larvas. <i>Amanita rubescens</i> y <i>A. excelsa</i> precisan de un tratamiento térmico (bien cocinadas por encima de 70 °C) para ser aptas para el consumo, pero no se pueden comercializar.		