

*Clitocybe diatreta* (Fr.) P. Kumm.



© Nino Santamaría

*Lepista inversa* (Scop.) Pat.



© Miguel Ángel Ribes

*Lepista inversa* (Scop.) Pat.



© Juan Carlos Zamora

Pampeta, seta de embudo

	<i>Clitocybe diatreta</i>	<i>Lepista inversa</i>
<b>Sombrero</b>	Pronto plano, higrófono, un poco embudado, beige encarnado a rosado, blanco al secarse, un poco pruinoso	No higrófono, primero umbilicado, luego infundibuliforme, con el margen largo tiempo enrollado, de color ocre rojizo o leonado
<b>Láminas</b>	Poco decurrentes, bastante apretadas, blancas, luego crema o con reflejos rosáceos	Muy decurrentes, apretadas y fácilmente separables. Al principio de color crema, al final tienden a enrojecer
<b>Carne</b>	Pálida en la superficie. Olor afrutado más o menos débil (de <i>Lepista</i> ) o a fresa	Compacta, coriácea, blanquecina o de color crema. Olor imperceptible
<b>Hábitat</b>	En coníferas musgosas, ubicua, a menudo en terrenos arenosos	Muy común en otoño en los bosques de coníferas
<b>Observaciones</b>	<i>Clitocybe diatreta</i> se distingue de <i>Lepista inversa</i> , especie comestible pero no comercializable, por su tamaño algo menor, sombrero higrófono no tan embudado y láminas poco decurrentes. Produce una intoxicación neurovegetativa (síndrome micocolinérgico, muscarínico o sudoriano).	