

***Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm.**
(≡ *H. sublateritium* (Fr.) Quél.)



© Javier Marcos

***Agaricus heinemannianus* Esteve-Rav.**



© Fermín Pancorbo

***Hypholoma lateritium* (Schaeff.) P. Kumm.**
(≡ *H. sublateritium* (Fr.) Quél.)



© José Cuesta

	<i>Hypholoma lateritium</i>	<i>Agaricus heinemannianus</i>
Sombrero	Cutícula seca, lisa, de color rojo ladrillo	Cutícula pardo purpúrea, burdeos, lisa, con fibrillas
Láminas	Densas, primero blanquecinas, luego grisáceas a violáceo oliváceas	Densas, grises con reflejos rosados de jóvenes, finalmente pardo negruzcas
Pie	Hueco, blanquecino en el ápice, más tarde pardo ocráceo hacia la base. Sin anillo	Blanco o rosado en el ápice, liso por encima del anillo, fibrilloso por debajo
Carne	Blanquecina amarillenta de olor desagradable y sabor amargo	Blanquecina, amarilleando espontáneamente en la superficie, especialmente en la base del pie. Olor anisado
Hábitat	Saprobio en troncos y tocones de planifolios y en menor grado de coníferas	Mediterráneo, en suelos arenosos, tanto bajo pinos como encinas y jaras
Observaciones	<i>Hypholoma lateritium</i> se diferencia fácilmente de <i>Agaricus heinemannianus</i> , especie comestible que no se puede comercializar, por la coloración de las láminas, la ausencia de anillo, la ausencia de olor anisado y el hábitat. El género <i>Hypholoma</i> en general produce intoxicaciones de tipo digestivo con un periodo de incubación breve, que cursan con una sintomatología de náuseas, vómitos y diarreas. <i>Hypholoma lateritium</i> ha producido intoxicaciones mortales en varios países de Europa. No se puede comercializar ninguna especie del género <i>Hypholoma</i> .	