

Ramaria formosa (Pers.) Quél.



Coliflor, pie de rata

© Pablo Pérez-Daniéls


Ramaria formosa (Pers.) Quél.



Coliflor, pie de rata

© Miguel Ángel Ribes

Ramaria flava (Schaeff.) Quél.



Barba de chivo

© Pablo Pérez-Daniéls

	Ramaria formosa	Ramaria flava
Color de las ramas	De color salmón con los ápices amarillos	De color amarillo tanto en las ramas como en los ápices
Hábitat	Crece bajo fagáceas: haya (<i>Fagus sylvatica</i>), castaño (<i>Castanea sativa</i>), robles y encina (<i>Quercus</i> sp.)	Crece bajo fagáceas, abetos y pinos
Observaciones	<i>Ramaria formosa</i> es una especie laxante y purgante. Los ápices de las ramas son amarillos y destacan del color asalmonado de las ramas, sin embargo, al envejecer, debido a la acumulación de esporas, se suele homogeneizar todo el color hacia el naranja. En cualquier caso, <i>Ramaria formosa</i> no tiene toda la superficie de las ramas de color amarillo como <i>Ramaria flava</i> y otras especies similares comestibles. No puede comercializarse ninguna especie del género <i>Ramaria</i> .	