

**Ramaria mairei** Donk. (= *R. pallida* (Schaeff.) Ricken *ss. auct.*)



© Pablo Pérez-Daniéls

**Ramaria botrytis** (Pers.) Bourdot



© Pablo Pérez-Daniéls

Coliflor rosa

**Sparassis crispa** (Wulfen) Fr.



© José María Costa

Seta coliflor, cagarria, cascarría

	<b>Ramaria mairei</b>	<b>Ramaria botrytis</b>	<b>Sparassis crispa</b>
<b>Porte</b>	Coraloide	Coraloide	Aspecto de coliflor
<b>Color de las ramas</b>	Blancas con ápices del mismo color o violáceos	Blancas con los ápices de rojo a púrpura	De isabelino a marrón rosado homogéneo
<b>Sección de las ramas</b>	Cilíndrica	Cilíndrica	Plana
<b>Hábitat</b>	En suelo, micorrizógeno	En suelo, micorrizógeno	En la base o tocón de pinos, parásito y saprobio
<b>Observaciones</b>	<i>Ramaria mairei</i> es una especie laxante y purgante de color blanquecino que en la juventud suele tener ocasionalmente los ápices con tonos violáceos. Se distingue bien de <i>Ramaria botrytis</i> , especie comestible que no se puede comercializar, por tener esta los ápices rojos o púrpuros. De <i>Sparassis crispa</i> (cagarria, seta coliflor) se distingue por no crecer sobre tocones o raíces enterradas de pino y por su aspecto coraloide y no de coliflor. No se puede comercializar ninguna especie del género <i>Ramaria</i> .		