

Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla picante, falsa negrilla

Tricholoma portentosum (Fr.) Quéél.



© Luis Alberto Parra

Capuchina, seta de charol

Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla picante, falsa negrilla

	<i>Tricholoma virgatum</i>	<i>Tricholoma portentosum</i>
Sombrero	Típicamente cónico en la juventud, con mamelón puntiagudo, apenas viscoso en tiempo húmedo, siempre sin tonos amarillentos	Acampanado a convexo en la juventud, con mamelón más o menos ancho, viscoso en tiempo húmedo, a veces con tonos amarillentos en las zonas poco pigmentadas
Pie	Blanco con tonos grisáceos	Blanco con tonos amarillentos
Láminas	Blanco grisáceas a grises	Blanco amarillentas, a veces algo rosadas o grisáceas en la madurez
Sabor	Desagradable, amargo picante	Agradable, harinoso
Observaciones	Extremar las precauciones con cuerpos fructíferos de <i>T. portentosum</i> muy jóvenes (por falta de desarrollo en forma y coloración) o muy viejos (por la coloración grisácea que pueden adoptar las láminas). También es posible confundir <i>T. virgatum</i> con muchos otros <i>Tricholoma</i> grises, como los del grupo de <i>T. terreum</i> y <i>T. sculpturatum</i> , más pequeños y escamosos, con mamelón ancho y frágiles, así como con los del grupo de <i>T. atrosquamosum</i> y <i>T. squarulosum</i> , de sombrero más escamoso lanoso y pie a menudo ensanchado en la base (en <i>T. squarulosum</i> además con numerosas escamitas oscuras).	