

Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. (= E. lividum Qué.)



© Javier Marcos

Seta engañosa, pérvida

Calocybe gambosa (Fr.) Donk



© Javier Marcos

Seta de San Jorge, perrechico, mansarón

Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. (= E. nidorosum (Fr.) Qué.)



© Miguel Ángel Ribes

	Entoloma sinuatum	Entoloma rhodopolium	Calocybe gambosa
Sombrero	Pálido, no higrófono	Higrófono, margen estriado en tiempo húmedo, pardo amarillento más oscuro en el centro	Cutícula seca, blanquecina a cremosa
Láminas	Amarillentas de joven, luego asalmonadas, al final ocre rosadas	Blancas al principio, luego rosa carne	Apretadas, blanquecinas
Carne	Firme, blanca, olor y sabor a harina	Delgada, blanca, con olor fuerte a lejía	Firme, compacta, con olor intenso a harina
Hábitat	En bosques húmedos de planifolios, del verano hasta bien entrado el otoño	En bosques húmedos de planifolios en otoño	En praderas con espino albar, endrinos, etc., formando corros de brujas, en primavera
Esporada	Rosa en masa	Rosa en masa	Blanca en masa
Observaciones	<p><i>Entoloma sinuatum</i> es una especie carnosa de gran porte, que por el aspecto y su olor a harina es fácilmente confundible con los apreciados perrechicos (<i>Calocybe gambosa</i>), afortunadamente no comparten época de fructificación, aunque en primaveras lluviosas y principios de verano puede fructificar, por lo que podría recolectarse. <i>E. rhodopolium</i> es más pequeña, más oscura y también otoñal. Ambas causan trastornos gastrointestinales intensos. <i>Calocybe gambosa</i> crece en prados en primavera formando corros de brujas.</p>		

Entoloma niphoides Romagn. ex Noordel.



© Luis Miguel García Bona

Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm.



© Fermín Pancorbo

Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Macica, seta en escudo

	<i>Entoloma niphoides</i>	<i>Entoloma clypeatum</i>
Sombrero	Más o menos cónico aplanado, no higrófono, de color blanco puro cuando está húmedo, sedoso, brillante	Cónico a cónico convexo, a menudo con mamelón obtuso y amplio, higrófono en ejemplares maduros, de color pardo con tonos grisáceos u oliváceos, liso, ligeramente viscoso en tiempo húmedo
Láminas	Blancas al principio, luego de color rosa carne	Blanquecinas a grisáceas al principio, luego claramente rosadas
Carne	Blanca, con olor a harina	Blanca o grisácea, con olor a harina rancia
Hábitat	Bajo rosáceas, principalmente espino albar y endrinos. Primavera	Bajo rosáceas (espino albar, endrinos, manzanos), a menudo en corros de brujas. Primavera
Observaciones	Aunque <i>Entoloma clypeatum</i> es una de las pocas especies comestibles de este género, su crecimiento en el mismo hábitat y misma época que <i>Entoloma niphoides</i> , tóxica, hace que sea posible su confusión. Por tanto es una buena medida precautoria no consumir ninguna de las especies del género <i>Entoloma</i> , además de no ser comercializable ninguna de ellas.	

Entoloma vernum S. Lundell



© Fermín Pancorbo

Marasmius oreades (Bolton) Fr.



© Enrique Rubio

Senderuela, seta de carrerilla

Entoloma vernum S. Lundell



© Miguel Ángel Ribes

	<i>Entoloma vernum</i>	<i>Marasmius oreades</i>
Sombrero	Primero cónico, luego se expande, pardo grisáceo, higrófono, al secarse palidece a gris ceniciento en bandas radiales	Convexo con mamelón central, crema parduzco, higrófono, estriado en el margen
Láminas	De color pardo grisáceo, con reflejo rosado en la madurez	Espaciadas, de color blanco cremoso
Carne	Fibrosa, del mismo color que el sombrero, olor poco notable	Cartilaginosa y elástica, olor aromático con reflejo cianico (almendras amargas) o de heno
Pie	De color similar al sombrero, ensanchado en la base, a veces algo comprimido con un surco longitudinal, pronto hueco y fistuloso, frágil	De color similar al sombrero. Macizo, duro y elástico. Se puede retorcer sin romper
Hábitat	Exclusivamente primaveral, en bosques de coníferas, especialmente de montaña	Todo el año en prados en corros de brujas, en pequeños grupos, raramente aisladas. A veces fuera de los prados, pero siempre en zonas abiertas de bosques, jardines y parques
Observaciones	En los mismos ambientes crecen <i>Entoloma hirtipes</i> (primaveral) o <i>Entoloma sericeum</i> (otoñal/invernal), con olor a harina rancia. La intoxicación por <i>Entoloma vernum</i> presenta dolores abdominales con diarrea profusa. <i>Marasmius oreades</i> es una especie que crece durante todo el año, principalmente en prados formando corros de brujas, pero en ocasiones aparece fuera de los prados en claros de bosques, pudiendo confundirse entonces con <i>Entoloma vernum</i> . No puede comercializarse ninguna especie del género <i>Entoloma</i> .	